# CASO 2

B.M. es una mujer de 92 años de edad, viuda, con deterioro del estado general.

**ANTECEDENTES PERSONALES**

- HTA.
- DM II.
- Síndrome de silla turca vacía.
- Histerectomizada.
- Episodios de ACV isquémicos hace 15 y 6 años respectivamente.
- Síndrome depresivo crónico a raíz del fallecimiento de su esposo.
- Deterioro cognitivo de perfil subcortical de al menos dos años de evolución.

**TRATAMIENTO HABITUAL**

- Omeprazol 20 mg.
- Metformina 850 mg.
- Adiro 300 mg.
- Duloxetina 30 mg.
- Trazodona 100 mg.
- Lorazepam 1 mg.

**VALORACION GERIATRICA INTEGRAL**

Valoración funcional: I. Lawton 0/8

I. Katz: F (independiente en alimentación)

I. Barthel: 40 (Movilización con gran ayuda. Uso de silla de ruedas)

Valoración mental: Deterioro cognitivo moderado GDS 4.

Actualmente sin síntomas afectivos.

Valoración social: Hace tres meses falleció su hija, su cuidadora habitual. El hijo con el que convive actualmente nos comenta que no puede atenderla bien, porque hace trabajos esporádicos, pasa poco tiempo en casa y no cuenta con más apoyo familiar.

**EPISODIO ACTUAL:**

Hace 15 días presenta úlcera en zona de trocánter derecho. No presenta clínica respiratoria, urinaria ni fiebre.

**PREGUNTAS:**

1. Comente el proceso agudo y desarrolle el tema.
2. Valore los recursos sociales más adecuados a la situación planteada.